


# Моите 5 моменти за хигиена на рацете

## При нега на пациент со периферен венски катетер



### Дополнителни клучни упатства за периферни интравенски катетери

1. **Индикација:** Да се провери дали употребата на периферен венски катетер е индицирана. Да се отстрани катетерот кога веќе не е потребен/клинички индициран.
2. **Поставување/одржување/отстранување на катетер.**
  - 2.1 Пред да се постави катетер да се исчисти кожата со антисептик (70% алкохол, јодна тинктура, јодоформ или алкохолен раствор на 2% хлорхексидин-глюконат).
  - 2.2 Пред поставување и отстранување на катетер и при земање примерок од крв да се користат чисти, нестерилни ракавици и да се примени антисептична постапка (техника без допир).
  - 2.3 Сувите гази да се менуваат на секои два дена.
  - 2.4 Да се размислува за менување на катетерот после поминати 96 часа.
  - 2.5 Да се менуваат цевчињата кои се користат за давање крв, крвни продукти, хемотерапија и масни емулзии во рок од 24 часа од почетокот на инфузијата. Да се размислува за менување на сите други цевчиња на секои 96 часа.
3. **Следење:** Да се евидентира времето и датумот на поставување и отстранување на катетерот и на менување на преврската, како и состојбата (визуелниот изглед) на местото на катетерот секој ден.



Светска здравствена  
организација

СПАСЕТЕ ЖИВОТ  
Чистете ги рацете

Чистата нега  
е побезбедна нега  
2005-2015