

GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2025/2026

(java e nëntëmbëdhjetë, deri më 10.05.2026)


TË DHËNA JAVORE

Gjatë **javës së nëntëmbëdhjetë** të vitit 2026 (nga 04-10.05.2026) në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar 69 ($I=3,8/100.000$) raste të të prekureve nga gripi/sëmundjet e ngjashme me gripin, për 23,2% më shumë se javën që shkoi (56).

Në javën e nëntëmbëdhjetë të vitit të kaluar janë regjistruar 50 të sëmurë (rritje për 38,0%), ndërsa krahasuar me modelin për 15 sezonet e fundit (30) është regjistruar një rritje prej 2,3 herë.

Incidenca e aktivitetit sezonal të virusit të gripit gjatë javës së nëntëmbëdhjetë është në kufirin e aktivitet jashtësezonal të virusit të gripit.

Grafiku 1. Intensiteti dhe shpërndarja javore e të sëmurëve nga gripi/sëmundje të ngjashme me gripin sipas lakores epidemiologjike 2010-2025, sezoni 2024/2025 dhe sezoni 2025/2026



Sa i përket grupmoshës, tek grupmosha nga 15-64 vjet janë regjistruar 39 të sëmurë, 16 mbi 65 vjet, ndërsa tek grupmoshat e tjera numri i të sëmurëve është nën 10.

Incidenca më e lartë ($8,3/100.000$) është regjistruar tek grupmosha 0-4 vjet.

Personat e sëmurë të kësaj jave janë regjistruar në 9 QSHP/NJR, pra në Prilep – 27, Shkup – 18, ndërsa në 7 qytete të tjera numri i të sëmurëve është nën 10. Në qytetet e tjera nuk janë raportuar raste të të sëmurëve nga gripi.

Mbikëqyrja virologjike

Gjatë javës së nëntëmbëdhjetë të raportimit pranë pranë laboratorit të virologjisë të ISHPRMV-së kanë arritur 41 materiale për analiza laboratorike për gripin, paralelisht të analizuara për Influenza, SARS-CoV-2 dhe/ose RSV.

Nga materialet e testuara është regjistruar një rast pozitiv për prani të virusit të gripit - Influenza A(H1)pdm09.

Është detektuar një rast pozitiv me SARS-CoV-2 dhe 6 raste me RSV

MBIKËQYRJA EPIDEMIOLOGJIKE - TË DHËNA KUMULATIVE

Gjatë sezonit 2025/2026 numri i përgjithshëm i të prekurve nga gripi/sëmundje të ngjashme me gripin është **17.194 (I=936,1/100.000)**.

Krahasuar me periudhën e njëjtë të sezonit të kaluar (n=26.005) numri i rasteve të raportuara është zvogëluar për 33,9%, ndërsa krahasuar me modelin për 15 vitet e fundit (n=20.784) është regjistruar një rënie prej 17,3%.

Të sëmurë janë regjistruar në të gjitha QShP/NjR. Numri më i madh i të sëmurëve (n=5.600) është regjistruar në Shkup, ndërsa incidencë më e lartë kumulative (I=2.754,5/100.000) në Dibër (n=527).

Sa i përket shpërndarjes të të sëmurëve sipas grupmoshës, numri më i madh i të sëmurëve bëjnë pjesë në grupmoshën që përfshin numrin më të madh të popullatës (nga 15-64 vjet) – 10.007 raste (58,2%), ndërsa incidencë më e lartë (2.078,3/100.000) është regjistruar tek grupmosha 0-4 vjet dhe 5-14 vjet (1.348,5/100.000).

Shpërndarja e rasteve sipas muajve tregon se numri më i madh i të sëmurëve është regjistruar në muajin janar– 9.315 raste ose 54,2%.

Deri më tani janë regjistruar 4 raste të vdekjes si pasojë e gripit.

MBIKËQYRJA VIROLOGJIKE – TË DHËNA KUMULATIVE

Deri më tani në sezonin 2025/26, pranë laboratorit të virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik të RMV-së kanë arritur 1.377 materiale nga mbikëqyrja rutinore dhe SARI për analiza laboratorike për gripin, paralelisht të analizuara për Influenza, SARS-CoV-2 dhe/ose RSV.

Janë zbuluar 127 raste pozitive të gripit:


- **Influenza A – 127**
 - Influenza A(H1)pdm09 – 42 (33,1%)
 - Influenza A(H3) – 70 (55,1%)
 - Influenza A – e pasubtipizuar – 15 (11,8%)

- **Influenza B – 0**

Janë regjistruar 29 rezultate pozitive për SARS-CoV-2 dhe 167 pozitive për RSV.

Janë detektuar edhe 5 viruse të tjerë respiratorë tek mostrat e testuara.

Grafiku 2. Shpërndarja javore e numrit dhe përqindjes të mostrave pozitive të gripit, mbikëqyrja rutinore dhe sentinel, RMV, 2025/2026



KOMENT EPIDEMIOLOGJIK

Incidenca e raportuar është në kornizat e aktivitetit jashtësezonal. Rezultatet e fituara nga mbikëqyrja virologjike tregojnë se nuk ka aktivitet të virusit të gripit. Përqindja e rasteve pozitive për më shumë javë me radhë është mbi 10%.

Sipas të dhënave të pranuar në Maqedoni ka një intensitet të ulët të virusit të gripit.

VAKSINIMI KUNDËR GRIPIT SEZONAL

❖ Për sezonin 2025/2026, Ministria e shëndetësisë siguroi 80.000 doza të vaksinë katërvalente falas për grupet prioritet të popullatës.

Vaksinimi kundër gripit për sezonin 2024/2025 filloi në 16.10.2024 dhe zbatohet në Shtëpitë e shëndetit dhe/ose Qendrat e shëndetit publik me Njësitë e tyre rajonale. Vaksinimi i punonjësve shëndetësorë do të bëhet në Institutin e Shëndetit Publik. Caktimi i termineve për vaksinat falas bëhet nëpërmjet uebfaqes www.vakcinacija.mk.

Sipas të dhënave të Drejtorisë për Shëndetësi Elektronike, nga fillimi i vaksinimit e deri në përmbylljen e këtij raporti **gjithsej janë vaksinuar 77.281 persona të kategorive të cënueshme të popullatës me vakcina falas.**

❖ 2.400 vakcina komerciale shtesë janë siguruar nga ana e Qendrave të shëndetit publik si vakcina për pjesën tjetër të popullatës dhe ato mund të merren për një kompensim financiar të caktuar në Qendrat e Shëndetit Publik dhe Njësitë e tyre rajonale.

Sipas të dhënave të Drejtorisë për Shëndetësi Elektronike **me vakcina komerciale janë vaksinuar gjithsej 1.843 persona.**

Në Maqedoninë e Veriut janë vaksinuar gjithsej 79.124 persona me vakcina falas dhe vakcina komerciale.

RAJONI EVROPIAN

*Burimi: <https://erviss.org/>

Sipas Raportit të ERVISS të publikuar në javën e dhjetë të vitit 2026:

- Shkalla e morbiditetit të gripit (ILI) dhe /ose infeksioneve respiratore akute (ARI) është rritur mbi nivelet bazë në 1 nga 27 vendet rajonit evropian të OBSH-së që raportojnë.
- Qarkullimi i virusit të gripit është në nivel messezonal në të gjithë rajonin, me çrast në mbrojtjen shëndetësore primare në të shumtën e rasteve detektohet influenza B, ndërsa në mbikëqyrjen sentinel në mbrojtjen shëndetësore sekundare influenza A.
- Indikatorët rajonalë për SARS-CoV-2 mbeten në nivele bazike.
- Qarkullimi i RSV po kthehet në nivel messezonal edhe në mbrojtjen shëndetësore primare edhe në mbrojtjen shëndetësore sekundare, por sërish ka disa vende ku mbetet e lartë. Fëmijët në moshë nën 5 vjet vazhdojnë të përfaqësojnë ngarkesën më të madhe të RSV.

***Departamenti i epidemiologjisë të sëmundjeve ngjitëse
Instituti i Shëndetit Publik***