

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБА СО ГОЛЕМА КАШЛИЦА ВО Р.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2024 ГОДИНА, ЗАКЛУЧНО СО 14.11.2024

Неделни податоци

Во периодот од 08-14.11.2024 година пријавени се 9 нови случаи на голема кашлица, за разлика од минатиот седмодневен период кога беа регистрирани само три случаи.

Пријавени се 7 случаи од Скопје и по еден случај од Куманово и Кратово.

Три случаи припаѓаат на возрастната група под 1 година, по два случаи припаѓаат на возрастната група од 1-4 години, и по еден случај е на возраст од 10-14 години и 30-39 години. Во однос на вакциналниот статус, 5 лица од заболените не се вакцинирани, 2 се комплетно вакцинирани и по еден случај е некомплетно вакциниран или вакциниран согласно возраста.

Три случаи се хоспитализирани, и тоа два од нив на возраст под 1 година и еден на возраст од 1-4 години.

Кумулативни податоци

- Во 2024 година, на територијата на Република Северна Македонија, регистрирани се вкупно 1.163 лица, заболени од голема кашлица.
- Најголем број од заболени лица се регистрирани на територијата на Скопје (70,5%), а заболени се регистрирани и во 22 други градови низ РСМ.
- Во тек се три епидемии пријавени во ниво на територијата на Скопје, Куманово и Тетово.
- Најголем број заболени припаѓаат на возрастната група од 0-4 години (36,8%), највисока инциденца се бележи во возрастната група под 1 година и изнесува 1.536,1/100.000 жители.
- Од вкупниот број на регистрирани случаи (1.163), 737 случаи (односно 63,4%) не биле вакцинирани, не се комплетно вакцинирани согласно возраста или немаат доказ за вакцинација.
- Од случаите кои се комплетно вакцинирани (n=300), просек на поминато време од последната доза на вакцина до заболување изнесува 11,9 години.
- Вкупно се хоспитализирани 187 случаи, од кои најголем дел припаѓаат на возрастната група од 0-4 години (n=164, 87,7%), кои во просек биле хоспитализирани по 8 денови.
- Од пријавените 1.163 случаи, лабораториски се потврдени 1.161 случај.
- Од 18.01-14.11.2024, на територијата на РСМ **дадени се вкупно 82.466 дози на вакцина** која содржи компонента против голема кашлица.

Препораки

Со цел да се превенира појавата на нови случаи на голема кашлица и да се спречи понатамошно ширење на заболувањето потребно е:

- Да се зголеми опфатот со примарната вакцинација со вакцина која ја содржи компонентата против голема кашлица со цел да се достигне опфат од 95%, како на регионално и локално, така и на национално ниво.
- За таа цел, во сите вакцинални пунктови на територијата на РСМ потребно е да се врши засилена и континуирана проверка на лицата кои подлежат на редовна вакцинација, и да се повикуваат за апликација на потребните дози на вакцина. Дополнително, потребно е засилено активно избарување на неевидентирани, невакцинирани и некомплетно вакцинирани лица, со цел нивно повикување и вакцинирање согласно националниот Календар за имунизација.
- Епидемиолошките служби при ЦЈЗ/ПЕ во соработка со ДСЗИ да спроведуваат засилена контрола во вакциналните пунктови, проверка на вакциналниот статус на подлежащите лица, изнаоѓање на невакцинирани и некомплетно вакцинирани лица.
- Да се зајакне епидемиолошкиот надзор над голема кашлица. Секој суспектен случај кој исполнува клинички критериуми на дефиницијата на случај потребно е епидемиолошки да се истражи, лабораториски да се тестира, односно потврди и да се пријави до надлежните институции.
- Сомнителните/заболените лица да се испраќаат за лабораториска дијагноза и лекување, и веднаш да се пријават до надлежните институции.
- Изолација на заболените во здравствените институции или во домашни услови, особено ако во семејството има доенчиња, мали деца и невакцинирани лица, најмалку 5 дена од отпочнување со антибиотска терапија. Истото важи и за сомнителните болни/контакти на заболените лица доколку примаат хемиопротекса.
- Сите матични лекари при преглед задолжително да го проверуваат вакциналниот статус на сите деца до 14 годишна возраст и сите пропуштени и невакцинирани деца да ги упатуваат на вакцинација;
- ЦЈЗ и ИЈЗ да спроведуваат едукативно-промотивни активности во врска со превенција од појава на голема кашлица, односно потенцирање на вакцинацијата како единствена превентивна мерка за заштита на здравјето на децата.

Проценка на ризик:

Голема кашлица во Р.С. Македонија се регистрира со спорадични случаи во последните 20 години (во просек 6).

Порастот на бројот на невакцинирани деца (пад на опфат со задолжителна имунизација), антивакциналните кампањи, но и колевливоста на родителите во однос на имунизацијата доведуваат до повторна појава на вакцино-превентабилни заболувања во Р.С. Македонија.

Имајќи го во предвид претходно наведеното, постои веројатност за понатамошно пријавување на нови случаи на цела територија на Р.С. Македонија.

Постои среден ризик за населението во региони со низок вакцинален опфат, но истиот може да се минимизира со држење до препораките од надлежните институции.

**Оддел за епидемиологија на заразни заболувања
Институт за јавно здравје на РСМ**

15.11.2024