

Информација за Повлекување на меѓународно дистрибуирана формула за новороденчиња „Нестле“ поради контаминација со цереулиден токсин

На ден 08.01.2026 во ИЈЗ на РСМ пристигната е информација за повлекување на прехранбен производ од северно македонскиот пазар. Станува збор за одредени NAN формули за бебиња, поради потенцијално присуство на цереулид-токсин произведен од бактерија *Bacillus cereus*, во една од состојките на добавувачот што се користи во следниве серии :

Нестле код	Име на производот	Серија-лот број	Рок на важност до:
12606122	NAN ExpPr HA BL DENWHB300 12x400g N2 RO	51280742C2	maj.27
12607942	NAN COMFORTIS1 NLNWPB109-2 6x800 N1 RO	51320346AE	maj.27
12607549	NAN OPTIPRO 1 NLNWPB261 6x800g N1 RO	51540346AB	jun.27
12607549	NAN OPTIPRO 1 NLNWPB261 6x800g N1 RO	52630346AB	Sep-27
12592158	NAN LACTOSE FREE NLNWB333 12x400g RO	53040346AE	okt.27
12607549	NAN OPTIPRO 1 NLNWPB261 6x800g N1 RO	51180346AD	apr.27

Според известувањето **превентивното повлекување** на производот од страна на Нестле Адриатик Македонија е во соработка со Агенција за храна и ветеринарство и во согласност со протоколите за квалитет и безбедност на производот.

Потрошувачите кои можеби ги купиле горенаведените серии од наведените производи не треба да го даваат овој производ на своето дете и можат да го вратат кај продавачот каде што е купен за поврат на средствата. Ако постои загриженост во однос на консумацијата на овој производ, потребно е да се направи консултација со педијатар или здравствен работник

Симтомите кои може да се јават поради присуство на цереулид-токсинот во храната се гадење, повраќање, болки во stomакот, слабост и истите се јавуваат најчесто во рок од 30 минути - 6 часа по консумирање на храната. Симптомите се слични како оние при труење со Стафилококниот токсин. Токсинот е стабилен

на високи температури и вообичаените начини на подготовка на храната не го уништуваат.

Болеста е воглавном самолимитирачка во рок од 24-48 часа но во одредени ситуации и кај имуникомпромитирани може да доведе до компликации.

Доколку постои сознание за консумирање на овие производи и појава на гастроинтестинални симптоми Ве молиме да се обратите до матичниот лекар или педијатар за евентуално понатамошно испитување и терапија.

Микробиолошката лабораторија при ИЈЗ на РСМ располага со реагенсии за детекција на *Bacillus cereus*.

***Оддел за епидемиологија на
заразни болести***

Институт за јавно здравје